

Jakelussa mainitut

UUSI TUTKIMUS REFRAKTAARIKELIAKIAN DIAGNOSTIIKKAAN

Tutkimusvalikoimaan on lisätty virtaussytometrinen tutkimus *Ts-Immunofenotyyppitys, refraktaarikeliakia (6411, Ts-RCD-Fc)*. Tutkimuksen avulla voidaan selvittää refraktaarikeliakian (RCD) lymfoomariskiä.

RCD-potilaat ovat pääsääntöisesti yli 50-vuotiaita. Refraktaarikeliakiaan, erityisesti tyypin II tautimuotoon, liittyy huomattavasti suurentunut suolistolymfooman (EATL) riski ja siksi potilaiden tunnistaminen ajoissa on tärkeää. Riskipotilaat voidaan löytää tutkimalla virtaussytometrialla ns. aberranttien T-solujen osuutta suolen villuksen intraepiteliaalisten lymfosyyttien joukosta. Selvästi suurentunut riski on niillä potilailla joilla aberranttien T-solujen osuus on yli 20%, jolloin kyseessä on tyypin II refraktaarikeliakia.

Lisätietoa uudesta tutkimuksesta ohjekirjassa.

Tiedustelut

Fimlab puhelinpalvelu 03-31177800 (arkisin 7-16)

Virtaussytometrian laboratorio, p 03 31176535

Samuli Rounioja, p 03 31177953

samuli.rounioja@fimlab.fi

Apulaisylilääkäri, Hematologian laboratorio

Tomi Koski

Ylilääkäri, vastuualueen johtaja

JAKELU

Tampereen yliopistollinen sairaala, Kanta-Hämeen keskussairaala ja Keski-Suomen keskussairaala: sisätaudit
Gastroenterologit